

Maßnahmen bei Kategorie 1 (Sporengelalt niedrig)

Verschärfte Hygienemaßnahmen

Sofortmaßnahmen:

Ordnungsgemäße Bienenversorgung

Räuberei ausschließen

Völker und Fluglöcher enghalten

Kümmerlinge auflösen

In Trachtpausen füttern

Maßnahmen bei Kategorie 1 (Sporengelalt niedrig)

Vorbereitende Maßnahmen:

Kontrolle der Nachbarstände (Futterkranzproben)

Altwaben aus den Völkern nehmen

Völker auf einen Brutraum drängen

dann mit Mittelwänden erweitern

Vorhandene freie Waben einschmelzen

Rähmchen mit Natronlauge auskochen

Böden reinigen und desinfizieren

Freie Beutenteile gründlich reinigen

Regelmäßige Völkerkontrollen

Genaue Brutkontrolle

Nur mit Mittelwänden erweitern

Komplette Bauerneuerung vorbereiten

Maßnahmen bei Kategorie 1 (Sporengelalt niedrig)

Entfernung der Sporenreserven aus den Völkern

Sporenreservoir in Altwaben, Brutwaben

Absperrung der Königin

Entfernung und einschmelzen der Altwaben

„Umtreiben“ auf Neubau Etagenweise oder über Fluglingbildung

Zeitgleich und Flächendeckend

Gleichzeitig bei Allen Völkern eines Standes

Wichtige unterstützende Maßnahmen:

Futterkranzproben untersuchen lassen

Jungvolkbildung durch Kunstschwärme

Leistungsstarke Königinnen

Varroabekämpfung mit Erfolgskontrolle

Bauerneuerung von 50 - 100% pro Jahr

Altvölker und Kümmerlinge auflösen

Völker vor der Einwinterung verstärken